

ARCHIWUM UNIwersYTETU JAGIELLOŃSKIEGO



ZESPÓŁ:

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego 1849-1945

SYGNATURA:

WF II 504 – Teczki akt doktorskich podania o dopuszczenie do egzaminów ścisłych, ocena pracy, załączniki 1860-1945

SYGNATURA OBIEKTU:

WF II 504 – Jurek Marian

DIGITALIZACJA:

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

2016 r.

1. NR ARCHIWUM: 805	2. NAZWA ARCHIWUM: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego	
3. NAZWA ZESPOŁU: Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego 1849-1945 (WF II)		
4. NR ZESPOŁU: 17	5. SYGNATURA OBIEKTU: WF II 504 – Jurek Marian	
6. LICZBA STRON/KART: 18		7. LICZBA SKANÓW: 18
8. DATA WYKONANIA: 2016	9. NAZWA PRACOWNI: Archiwum UJ	10. WYKONAWCA KOPII CYFROWYCH: Jacek Urbanowicz
11. UWAGI: -		



Do

Dzielnicy Wydziału Filozoficznego U.J.

W Krakowie

Proszę o dopuszczenie mnie do egzaminu
doktorskiego z zakresu mineralogii jako przedmio-
tu głównego i chemii jako przedmiotu podrzędnego.
W załączeniu składam program p. t. „Chemiczno-
mineralogiczne badania złóż solnych w Wi-
slicu”, metrykę urodzenia, curriculum vitae,
świadectwo dojrzałości, również prośbę o wyda-
nie absolutorjum.


Kraków 11 marca 1932

Charytan Jurek.

potwierdzeniem odbioru moich dokumentów
metrykę sw. dojrzałości absolutorjum

Kraków 5/XIII 1932

Charytan Jurek.



Colour Chart #13



WYDZIAŁ FIZYKI
KATEDRA FIZYKI
L. 555/2

W Krakowie dnia 14 marca 1932 r.

Wzrostek Prof. Dr. J.

Wzrostek Prof. Dr. J.

Wzrostek Prof. Dr. J.

Wzrostek Prof. Dr. J.

Wzrostek Prof. Dr. J.

Wzrostek Prof. Dr. J.

Wzrostek Prof. Dr. J.

WYDZIAŁ HISTORIOGRAFII
MUSEUM
L. 2507/30

W Warszawie, dnia 14 marca 1932 r.

Do

Wzrostom

Wzrostowi

Przebieg choroby

Przebieg choroby
a przebieg o wydaniu opinii na piśmie
czy na podstawie załączonych
można powiedzieć do tego

Warszawa

Przebieg choroby

Przebieg choroby
a przebieg o wydaniu opinii na piśmie
czy na podstawie załączonych
można powiedzieć do tego

Warszawa 14 marca 1932

Przebieg choroby
a przebieg o wydaniu opinii na piśmie
czy na podstawie załączonych
można powiedzieć do tego

L. 555/32

W Krakowie, dnia 17 marca 1932 r.

JW Panom Profesorom:

drowi Kreutzowi

" Nowakowi

przesyłam podanie Marjana Jurka
z prośbą o wydanie opinii na piśmie
czy na podstawie załączonej pracy
można kandydata dopuścić do rygo-
rozów.-

Dziekan Wydziału filozoficznego:

Krafer

*Przemysła oddziału nr 1
dnia 30. v. 1932 r.*

Dziekan: dr. Prof. Michałowski

Pracownik: Prof. Krafer

Promotor: " Kreutz

Curriculum vitae.

Urodziłem się w Wieliczce $\frac{7}{IX}$ 1904 r. W latach
od 1911 - 1915 roku ukończyłem szkołę powszechną -
a roku 1916 wstąpiłem do szkoły realnej w Wieliczce.
W 1923 roku po uzyskaniu egzaminu dojrzałości wstą-
piłem na Uniwersytet Jagielloński gdzie studiowałem
chemię i mineralogię. A roku 1928 wyjechałem przez
nad Elżbią w Wieliczce którą przerwałem w roku 1930
ponieważ zostałem powołany do wojska a roku 1931 po
powrocie z wojska ukończyłem ogólnieucielną pracę.

W Krakowie 11 marca 1932

Marjan Jurek.

Ocena pracy p. Mariana Jurka p.t.

Badania chemiczno-mineralogiczne i tożsamość w Wieliczce

przedłożonej jako teza doktorska.

W pracy niniejszej charakteryzuje p. Jurek porównawczo pokłady soli stora wielkiego z punktu widzenia chemicznego i mineralogiczno-petrograficznego (na podstawie badania mikroskopowego). Znane od dawna typy soli spirowej, wielkiej i sylwikowej, różniące się między sobą pod względem chemicznym w ten sposób, iż sól sylwikowa jest utworem najczystszy, natomiast sól wielka i spirowa są swym składem chemicznym bardzo zbliżone do siebie, różniąc się tylko ilością i jakością części nieorganicznych (iż w soli wielkiej, piasek w soli spirowej). Każda z tych odmian utrzymuje się natomiast w prawie niezmienionym składzie chemicznym i wykrystalizuje na maciernej przestrzeni zarówno w jednym, jak i w drugim, leżących częściowo nad sobą, poziomach. Tzw. sypek jest czystą solą kamienną, zawierającą drobne ilości $MgSO_4$.

Wrostki ciekłe iglowe są najliczniejsze w soli spirowej (do 20% objętości), w soli wielkiej osiąga 4%, sól sylwikowa zawiera ich bardzo mało.

Strukturalnie wyróżnia się sól spirowa, odznaczająca się wydłużeniem swych osłupków w kierunku upadku warstw.

w oli spirowej:

Proszę uwzględnić co oznaczają radzieckie wymagania egzaminu:
nawaga do osiągnięcia stopnia doktorskiego,

20/10 1932

St. Kreutz

W pracy niniejszej przedstawiamy i jurek porównujemy
położony, która stawa wielkiego punktu widzenia
chemicznego i mineralogicznego - petrograficznego (na
podstawie badania mikroskopowego). Inne od czasu
tytułu oli spirowej, niżej i wyżej, również się między
sobą jest względem chemizmu i temperatury, co jest wyrażone
jako stawa najprostszą, natomiast jest wielką i spira
na swoje istnienie chemizmu bardzo oblicza do siebie,
również do tych stawa i temperatury, które są wyrażone
(i to jest niżej, powyżej i woli spirowej). Ponadto jest
odmianą utrudniającą, natomiast jest to jest to jest to
istnienie chemizmu i wyrażone jest to jest to jest to
prezentami samymi w jednym, jak i to jest to jest to
odróżnia nad sobą, ponieważ. To jest to jest to jest to
ole kamienne, również jest to jest to jest to.

Wszystkie niektóre są najprościej woli spirowej
(do 20% objętości), woli niżej, również jest to jest to jest to
leżące jest bardzo mało.

Strukturalnie wyrażone jest to jest to jest to, odmacra-
jąca jest to jest to jest to jest to jest to jest to jest to
włoski.

W Krakowie, dnia 27. kwietnia 1932

Ocena dysertacji doktorskiej p. M. Jurka.

Od czasu monografii Wielicki J. Niedzwiedzkiego, po której przyszedł raczej dyskusyjnej natury prace Paula Tietze, Wielicka nie była przedmiotem badań geologicznych ani mineralogicznych. P. Jurk opracował głęboc typy soli wielickiej, tj. sol sztybarkowa, spiszowa, zielona i żółta solne miedowe (sepatki) pod względem mineralogicznym i chemicznym, stwierdzając, iż najczystszy utwór jest sol sztybarkowa, gdy sol spiszowa i zielona są do siebie bardzo zbliżone paramietyrami z tego, iż sol zielona jest raczej szersza na powierzchni, zaś sol spiszowa płaskiej. Sepatki jest różnicy odmiany „dysorty” z miedziarną domową $MgSO_4$. Autor wykazuje, iż odmiana do soli pochodzą z rozpuszczenia w czasie starzenia się soli warstw karpackich. Ze skąd tworzących strom soli wynika się p. Jurk „piaskowcem solnym”, którego spowinca jest sol, zaś miedziarną popatam pochodzą, są drugie z wydzielonych minerałów i żelazem, różni z piaskowców karpackich, podobnie jak odmiana w soli spiszowej.

Dla doświadczeń chemicznych ciekawych, omawiając specje mineralogicznych jak też warunki przynależności i górnictwa w soli spiszowej. Jednym z nich jest, która jest bardzo ważnym przyczynkiem do poznania naszych formacji solnych. Praca czyni radoc skutkiem wymagany warunkom rozprawy doktorskiej.

Jan Storal

L. 866/32

PROTOKÓŁ

dwu-godzinnego rygorozum z mineralogji i chemji z p. Marjanem
J U R K I E M, odbytego dnia 30. kwietnia 1932 r.

O b e c n i:

Przewodniczący: Dziekan Prof.dr. Szafer

Egzaminatorowie: " " Estreicher

" " Kreutz

" " Nowak

Egzamin rozpoczął o godz. 10 Prof.dr. Jan Nowak

i egzaminował do godz. 10.40 następnie egzaminował Prof.dr.

Wreichert

do godz.

w końcu egzaminował Prof.dr.

do godz.

Komisja Egzaminacyjna uznała wynik egzaminu za:

celujący

d. j. w.

Szafer

S. Kreutz

Jan Nowak
Wreichert

Michael

L. 1284/32

15

PROTOKOŁ

jedno-godzinowego egzaminu z filozofji z p. Marjan J U R E K
odbytego dnia 28. czerwca 1932 r.

O b e c n i :

Przewodniczący: Dziekan Prof. dr. Szafer

Examinatorowie:

" " Heinrich
" " Garbowski

Egzamin rozpoczął o godz. 9⁰⁰ Prof. dr. Garbowski
i egzaminował do godz. 9³⁰ następnie egzaminował Prof. dr.
Heinrich do godz. 10⁰⁰

Komisja Egzaminacyjna uznała wyniki egzaminu za:

d. j. w.

200 p. 100%
m. y. wieg. 100%
100%.

Szafer
T. Garbowski
Heinrich

Rewers

re prece de Ktoroz p. Maryana

Jurka

p.t. Chemism. miner. by. bodanie 2802
 schyzt w Wchirze

V. K. K. d. 11/11 1914

J. K. K.

